

# SL silver line Gel

avec Aloe, extrait de Cannabis  
Argent Colloïdal (10 ppm)



## INDICATIONS

- >> Aphtes, Ulcères, Stomatite aphteuse récurrente, Gingivite, Parodontite
- >> Mucosités dues à la radiothérapie et à la chimiothérapie
- >> Chirurgie orale, Extractions difficiles
- >> Implantologie
- >> Ulcères traumatiques causés par les prothèses dentaires et les appareils orthodontiques.
- >> Syndrome de la bouche brûlante

## Propriétés

- >> Adhère à la muqueuse buccale.
- >> Forme un film protecteur
- >> Formulation concentrée avec de l'argent colloïdal (10 ppm), effet antibactérien-antiviral, ph neutre
- >> A base d'extrait de cannabis, d'aloès, d'acide hyaluronique et de vitamine E.
- >> Sans fluor, sucres, agents matifiants, alcool, parfums, dérivés du pétrole, silicones et parabènes.

## Avantages

- >> Donne un soulagement rapide
- >> Élimine la sensation de brûlure
- >> Protège la muqueuse buccale
- >> Grâce à sa fonction antioxydante assure le bien-être et l'hygiène de la bouche

« GEL D'ARGENT COLLOÏDAL »  
Effet antibactérien et antiviral naturel »


## PROTOCOLE

1. Pour les aphtes, les ulcères et les stomatites aphteuses récurrentes, il est conseillé au patient d'appliquer le gel 2 ou 3 fois par jour sans rinçage sur les zones concernées pendant environ une minute.
2. Pour les gingivites et les parodontites, le gel est appliqué après la séance de thérapie parodontale non chirurgicale et il est conseillé au patient d'utiliser le gel 2 ou 3 fois par jour sans rinçage sur les zones affectées pendant environ une minute.
3. Le gel d'argent colloïdal adhère bien à la muqueuse buccale et crée un film protecteur, ce qui le rend idéal pour la chirurgie orale et les extractions, et il est recommandé de l'appliquer à l'intérieur de l'alvéole et sur les sutures.
4. Pour les opérations sur implants, il doit être appliqué après l'insertion de l'implant et après la réalisation des sutures.
5. En cas d'ulcères traumatiques dus aux prothèses amovibles et aux appareils orthodontiques, il est conseillé au patient d'appliquer le gel sous la selle en contact avec la gencive.
6. Pour les patients souffrant du syndrome de la bouche brûlante, il est conseillé au patient d'appliquer le gel 2 ou 3 fois par jour sur l'ensemble de la bouche pendant environ 1 minute sans rincer.

## MÉTHODES D'UTILISATION

Le gel d'argent colloïdal est appliqué à l'aide de seringues spécifiques munies d'un embout jetable, qui facilitent l'insertion du gel dans les poches parodontales, dans les alvéoles après avulsions dentaires et dans toutes les indications sur la muqueuse buccale. Les seringues avec un embout permettent une plus grande précision lors de l'application et un meilleur contrôle du dosage. Le remplissage de la seringue est facile.

## Aphtes



a) Image clinique de l'aphte - b) Application du gel d'argent  
c) Situation clinique après le traitement, le gel apaise la l'inconfort et accélère la guérison

## Cas clinique




Image clinique et radiographique défaut parodontal initial

Application du gel Silver Line



Image clinique et radiographique après 12 mois, notez la régénération osseuse.

## Recharge de la seringue



- 1) Retirer le piston et y insérer le gel
- 2) Assemblage de l'embout de l'applicateur
- 3) Insertion du piston